

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



**INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA RADICAL COMO FACTOR QUE AFECTA EL
NIVEL DE PERCEPCIÓN DE CALIDAD DE VIDA EN LAS PACIENTES CON
CÁNCER DE MAMA. HOSPITAL NACIONAL ALMANZOR AGUINAGA
ASENJO ESSALUD CHICLAYO**

TESIS
PARA OPTAR EL TITULO DE:
MEDICO CIRUJANO

AUTOR:
ROSARIO ALEXANDRA SOTO-CACERES CABANILLAS

TRUJILLO-PERU
2012
MIEMBROS DE JURADO

PRESIDENTE

SECRETARIO

MIEMBRO

ASESOR:

DR. JUAN ALBERTO DIAZ PLASENCIA

Profesor Principal

Facultad de Medicina Humana

Universidad Privada “Antenor Orrego”

Trujillo

COLABORADORES:

DR. MG. VICTOR ALBERTO SOTO CACERES

Profesor Principal

Facultad de Medicina Humana

Universidad Nacional ”Pedro Ruiz Gallo”

Lambayeque

AGRADECIMIENTOS

A DIOS, porque todo lo que tengo, lo que puedo y lo que recibo es regalo que Él me ha dado.

A mis Padres: Víctor y Narda por ser paradigma de fortaleza, empeño, honestidad y profesionalismo.

A mi más grande, colega, amigo y padre Dr. Víctor Soto Cáceres, por ayudarme a culminar esta etapa de mi vida como lo había soñado y apoyarme siempre con un “sí, se puede”.

A mis hermanos: Yoly, Kike y Jesús; porque hicieron ver el lado alegre en cada reto, creyendo en mí para poder superarlos y llenaron de aventuras cada día.

INDICE

	PAG
RESUMEN	6
ABSTRACT	7
I. INTRODUCCION	8
II. MATERIAL Y METODOS	15
III. RESULTADOS	26
IV. DISCUSION	40
V. CONCLUSIONES	45
VI. RECOMENDACIONES	46
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	49
VIII. ANEXOS	51

RESUMEN

Objetivo: Determinar en cuanto se afecta el nivel de percepción de calidad de vida en pacientes con cáncer de mama con la intervención quirúrgica radical en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo Chiclayo 2011

Material y métodos: Se realizó un estudio analítico tipo de casos y controles anidados en cohorte. Los Casos fueron 38 pacientes con neoplasia confirmada estadio operable intervenidas con cirugía radical (mastectomizadas) Controles: 38 pacientes con neoplasia confirmada estadio operable, que no han tenido cirugía radical (no mastectomizadas) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo durante el 2011. Se aplicaron los cuestionarios de calidad de vida EORTC QLQ C-30 y QLQ BR-23. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15.

Resultados: La calidad de vida global valorada por el cuestionario QLQ-C30 de parte de los casos fue de 77.4 ± 14.7 puntos muy semejante al de los controles 81.2 ± 14.5 puntos, sin diferencia significativa ($p < 0.745$), por otro lado la percepción de estado de salud general es de 76.7 ± 15.7 puntos en los casos y de 79.3 ± 15.1 puntos en los controles, con pequeña diferencia significativa entre ambos grupos ($p < 0.024$). La proporción de casos que tuvieron percepción de mala calidad de vida (< 60 puntos) fue de 21.1% sin existir diferencia estadística significativa con los controles que respondieron 15.7% ($p < 0.553$).

Conclusión: El nivel de percepción de mala calidad de vida en pacientes con cáncer de mama con la intervención quirúrgica radical se afecta solo en 5.27% más respecto a las pacientes que no tuvieron mastectomía.

Palabras claves: Calidad de vida, QLQ-C30, QLQ BR-23, mastectomía.

ABSTRACT

Objective: To determine how much it affects the level of perceived quality of life in patients with the breast cancer radical surgery at the National Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo of Chiclayo city, 2011

Material and methods: An analytical type of nested case-control cohort. Cases were 38 patients with operable stage confirmed neoplasia, operated by radical surgery: removal of all or more than 50% of the breast (mastectomy) Controls: 38 patients with operable stage confirmed neoplasia, which has not had radical surgery (not mastectomy) of the National Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo during 2011. We applied the quality of life questionnaires EORTC QLQ C-30 and QLQ BR-23. For data analysis we used SPSS version 15

Results: The overall quality of life assessed by the QLQ-C30 of cases was 77.4 ± 14.7 points very similar to controls 81.2 ± 14.5 points, no significant difference ($p < 0.745$), on the other hand the perception of state general health is 76.7 ± 15.1 points in the cases and $79.32 + 15.1$ points in controls, with little significant difference between groups ($p < 0.024$). The proportion of cases that had poor perception of quality of life (< 60 points) was 21.05% with no statistically significant differences exist with controls who responded 15.7% ($p < 0.553$).

Conclusion: The level of perceived poor quality of life in breast cancer patients with radical surgery affects only 5.27% more than in the patients who had mastectomy.

Keywords: Quality of life, QLQ-C30, QLQ BR-23, mastectomy.

NOTA:

Tesis no autorizada de publicación, para obtener más detalle de la tesis, acercarse a Sala de Tesis de la Biblioteca Central de la Universidad Privada Antenor Orrego, de la Ciudad de Trujillo.